

**DOSAGGIO CATECOLAMINE, METANEFRINE, NORMETANEFRINE ACIDO VANILMANDELICO, ACIDO 5-OH-INDOLOACETICO, 17-CHETOSTEROIDI, ACIDO OSSALICO, CORTISOLO NELLE URINE DELLE 24H**

**Materiale fornito:**

- Contenitore urine 24h
- Guanti
- Fialetta di Acido Cloridrico (HCl) concentrato (da conservare al buio e in un luogo fresco)

**NB: Provoca ustioni. Irritante per le vie respiratorie.**

Vedi *Interventi di Primo Soccorso* a piè pagina.

**Istruzioni per la raccolta:**

- Iniziare la raccolta dalle seconde urine del mattino fino alle prime (comprese) del mattino successivo.
- Versare le prime urine nel contenitore per le 24h.
- Indossare i guanti protettivi e versare la fialetta di acido cloridrico avendo cura di non creare schizzi. Attenzione, potrebbe verificarsi una piccola produzione di vapori o nebbie: NON INALARE.
- Raccogliere le successive urine in contenitori esterni e quindi versarle di volta in volta nel contenitore delle 24h, facendo sempre attenzione a non provocare schizzi.
- Conclusa la raccolta, assicurarsi di chiudere bene il tappo e trasportare il contenitore mantenendolo in posizione verticale al fine di evitare delle perdite.
- **RIPORTARE IN LABORATORIO IL VUOTO DELLA FIALETTA DI ACIDO CLORIDRICO.**

Note particolari: A partire da 48 ore precedenti e per tutto il tempo della raccolta, è necessario osservare una dieta priva dei seguenti alimenti: agrumi, ananas, avocado, banane, kiwi, more, prugne, melanzane, pomodori, frutta secca, caffè, tè, cioccolato. Durante lo stesso periodo, previa consultazione del medico curante, si consiglia di evitare l'assunzione di farmaci.

**Interventi di Primo Soccorso**

**Informazione generale**

*Consultare un medico e mostrare il presente modulo.*

**Se inalato**

*Se viene respirato, trasportare la persona all'aria fresca, lontano dalla fonte pericolosa. In casi gravi di arresto della respirazione, procedere con la respirazione artificiale. Consultare un medico.*

**In caso di contatto con la pelle**

*Lavare bene la pelle con sapone e abbondanti quantità d'acqua. Togliere immediatamente gli indumenti e le scarpe contaminate, lavarli prima di usarli di nuovo. Consultare un medico.*

**In caso di contatto con gli occhi**

*Sciacquare accuratamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti e rivolgersi ad un medico.*

**Se ingerito**

*NON indurre il vomito. Sciacquare la bocca con acqua. Non somministrare alcunché a persone svenute. Consultare un medico.*

